

Registro y primer voucher fotográfico de un lagarto enigmático: *Urostrophus longicauda* (Boulenger, 1891) en el Parque Nacional Iberá, Corrientes, Argentina

Alfredo Sabaliauskas

¹ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Av. Intendente Cantilo, C1428 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Localidad.— Parque Nacional Iberá sobre la Ruta Nacional 118 (27°54'58.7"S 57°27'20.0"W) en la localidad de San Antonio, Corrientes, Argentina (Fig. 1). El individuo fue hallado y fotografiado el 25/01/2025 a las 22:45 por Alfredo Sabaliauskas. Las fotografías (Fig. 2) fueron depositadas como voucher en el catálogo fotográfico del Instituto Nacional de Limnología (INALI 579).

Comentarios.— *Urostrophus longicauda* (Boulenger, 1891) es un lagarto que habita en arbustos y pastos altos (Etheridge y Williams, 1991) con escasas observaciones en Argentina, Paraguay y Brasil (Fig. 1). Los primeros registros en Argentina se obtuvieron en localidades del este de la provincia de Chaco y "localidades no especificadas" de Santa Fé y Misiones (Etheridge y Williams, 1991). Posteriormente, durante el llenado de la Represa Yacyretá, su distribución se extendió al noreste de Corrientes y Paraguay, (Álvarez *et al.*, 1995). Luego se colectaron ejemplares en la provincia de Corrientes, en la Estancia San Juan Poriahú, San Miguel (Waller, 2009) y en la Reserva Natural Provincial Isla Apipé Grande, Ituzaingó (Zaracho *et al.*, 2014). Los mismos se encuentran depositados en la Colección Herpetológica de la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes (UNNEC). En Paraguay hasta el momento, esta especie se encuentra restringida a la localidad de Itapúa, una región de pastizales mesopotámicos, y a San Pedro, región de Chaco Húmedo (Etheridge y Williams, 1991; Lions y Álvarez, 1996; Cacciali *et al.*, 2016). El registro más reciente fue realizado en el Complejo de Reservas Gouyra Reta (Sforza y Cacciali, 2020). Adicionalmente, se colectó un ejemplar en la Usina Hidroeléctrica Porto Primavera, Presidente Epitácio, en el estado de São Paulo, Brasil y fue depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo [MTR (LG 1370)] (Rodrigues *et al.*, 2014). Registros




Figura 1. Mapa de registros de *Urostrophus longicauda* en Sudamérica (arriba) y específicamente en Argentina (abajo). Círculos celestes: registros históricos (Etheridge y Williams, 1991; Lions y Álvarez, 1996; Waller, 2009; Rodrigues *et al.*, 2014; Zaracho *et al.*, 2014; Cacciali *et al.*, 2016; Sforza y Cacciali, 2020; GBIF, 2025). Estrella amarilla: nuevo registro. Áreas protegidas de Argentina: A) Parque Nacional Iberá, B) Reserva Natural Isla Apipé Grande y C) Sitio RAMSAR Humedales Chaco.

adicionales han sido reportados durante la revisión de puntos geográficos de colecciones herpetológicas (GBIF, 2025).

El individuo fue encontrado inmóvil sobre el asfalto de la Ruta 118. Se tomaron fotografías sobre la ruta, luego fue recogido y depositado en la vege-

tación circundante, donde fue fotografiado y posteriormente liberado. El espécimen fue catalogado como adulto, comparando el largo total aproximado con estudios previos (Boulegner, 1891; Etheridge y Williams, 1991), aunque no fue posible determinar el sexo. Este nuevo registro se encuentra a 30 km (al suroeste) del punto más austral conocido para la especie en nuestro país, es la segunda observación en el Parque Nacional Iberá, 16 años posterior a la primera, y aporta una nueva observación para la provincia de Corrientes.

Urostrophus longicauda se encuentra categorizada como Amenazada a nivel nacional (Abdala

et al., 2012) y Vulnerable a nivel internacional (Arzamendia *et al.*, 2017). Estas clasificaciones se justifican debido a una distribución restringida y pérdida de hábitat. Su biología es poco conocida, siendo asociado a pastizales inundables del Chaco Húmedo (Etheridge y Williams, 1991).

La obtención de registros fotográficos puede contribuir a la conservación de *Urostrophus longicauda* al facilitar la transmisión de conocimiento sobre su identidad y características físicas a la comunidad. Las fotografías constituyen una vía eficaz para divulgar sobre la existencia de este lagarto y concientizar sobre las problemáticas que sufren sus poblaciones.



Figura 2. Fotografías de *U. longicauda* depositadas en el catálogo fotográfico del Instituto Nacional de Limnología (INALI 579)

Agradecimientos

A Alejandro Giraudo, Henrique C. Costa, Pier Cacciali y Víctor Zaracho por su ayuda con la recopilación de información sobre registros históricos de la especie. A José Manuel Sánchez, Paola A. Carrasco y Paula Rivera por sus consejos y correcciones sobre la redacción del manuscrito.

Literatura citada

- Abdala, C.S., Acosta, J.L., Acosta, J.C., Álvarez, B.B., Arias, F., Avila, L.J., Blanco, M.G., Bonino, M., Boretto, J.M., Brancatelli, G., Breitman, M.F., Cabrera, M.R., Cairo, S., Corbalán, V., Hernando, A., Ibargüengoytia, N.R., Kacoris, F., Laspiur, A., Montero, R., Morando, M., Pelegrín Nicolás, Pérez, C.H.F., Quinteros, A.S., Semhan, R.V., Tedesco, M.E., Vega, L. and Zalba, S.M. 2012. Categorización del estado de conservación de las lagartijas y anfisbenas de la República Argentina. Cuadernos de Herpetología 26(Supl. 1): 215-248.
- Álvarez, B. B., M. L. Lions, R. Aguirre, J. Céspedes & A. Hernando. 1995. Herpetofauna del área de influencia del embalse de la represa de Yacyretá (Argentina - Paraguay). FACENA, 11: 57-73.
- Arzamendia, V., Fitzgerald, L., Giraudo, A., Kacolis, F., Montero, R., Pelegrin, N., Scrocchi, G. & Williams, J. 2017. *Anisolepis longicauda*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T203135A2761080
- Boulenger, G.A. 1891. Description of a new genus of Iguanoid lizards. Annals and Magazine of Natural History 8: 85-86.
- Cacciali, P., N. Scott, A.L. Aquino Ortiz, L.A. Fitzgerald and P. Smith. 2016. The reptiles of Paraguay: literature, distribution, and an annotated taxonomic checklist. Special Publication of the Museum of Southwestern Biology 11: 1-373.
- Etheridge, R. and Williams, E.E. 1991. A review of the South American lizard genera *Urostrophus* and *Anisolepis* (Squamata: Iguana: Polychridae). Bulletin of the Museum of Comparative Zoology 152: 317-361.
- GBIF.org (23 March 2025). Global Biodiversity Information Facility, Occurrence Download <https://doi.org/10.15468/dl.a2wjkp>
- Lions, M.L. & Álvarez, B. 1996. Geographic distribution. *Anisolepis longicauda*. Herpetological Review 27: 32.
- Rodrigues, Miguel & Bertolotto, Carolina & Amaro, Renata & Yonenaga-Yassuda, Yatiyo & Freire, Eliza & Pellegrino, Katia. (2014). Molecular phylogeny, species limits, and biogeography of the Brazilian endemic lizard genus *Enyalius* (Squamata: Leiosauridae): An example of the historical relationship between Atlantic Forests and Amazonia. Molecular phylogenetics and evolution. 81.
- Sforza, Lorena & Cacciali, Pier. (2020). Presence of *Anisolepis longicauda* (Boulenger, 1891) (Reptilia: Squamata: Leiosauridae) in the Guyra Reta Reserve Complex. Paraquaria Natural. 07. 43-45. 10.32525/ParaquariaNat.2019. (7):43.58.
- Waller, T. 2009. *Anisolepis longicauda* Boulenger, 1891 (Squamata, Leiosauridae). Primera cita para la provincia de Corrientes, Argentina. Cuadernos de Herpetología 23: 67
- Zaracho, V.H., M.R. Ingaramo, R.V. Semhan, E. Etchepare, J.L. Acosta, A.C. Falcione y B.B. Álvarez. 2014. Herpetofauna de la Reserva Natural Provincial Isla Apipé Grande (Corrientes, Argentina). Cuadernos de Herpetología 28: 153-160.

Recibida: 02 Abril 2025

Revisada: 24 Abril 2025

Aceptada: 22 Mayo 2025

Editor Asociado: S. Quinzio

doi: 10.31017/CdH.2025.(2025-011)

© 2025 por los autores, licencia otorgada a la Asociación Herpetológica Argentina. Este artículo es de acceso abierto y distribuido bajo los términos y condiciones de una licencia Atribución-No Comercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

